



Gebrauchsinformation
bitte sorgfältig lesen!



Echinacea angustifolia Rh D3

Wässrige Verdünnung

Zusammensetzung

10 ml enthalten: Arzneilich wirksamer Bestandteil:
Echinacea angustifolia Rh Dil. D3 (HAB, V. 21) 10 ml.

Darreichungsform und Packungsgröße

20 ml Wässrige Verdünnung

Anthroposophisches Arzneimittel

Weleda AG Postfach 1309/1320 D-73503 Schwäbisch Gmünd

Anwendungsgebiete

gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis

Zur Harmonisierung der Empfindungsorganisation bei fieberhaften, entzündlichen umschriebenen und systemischen Prozessen, z.B. Furunkulose, schlecht heilende Wunden, Entzündungen der weiblichen Unterleibsorgane (Adnexitis, Parametritis, Endometritis), Lymphknotenentzündung, vorübergehendes Auftreten von Bakterien im Blut (Pyämie), grippale Infekte.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Echinacea angustifolia Rh D3 Wässrige Verdünnung nicht anwenden?

Echinacea angustifolia Rh D3 Wässrige Verdünnung soll nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegen Echinacea oder gegen Korbblütler.

Aus grundsätzlichen Erwägungen darf die Anwendung nicht erfolgen bei fortschreitenden Systemerkrankungen wie Tuberkulose, bösartigen Erkrankungen der weißen Blutzellen (Leukosen), systemisch-entzündlichen Erkrankungen des Bindegewebes (Kollagenosen), Multipler Sklerose, AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion, und anderen Autoimmun-Erkrankungen.





Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Wie alle Arzneimittel sollte Echinacea angustifolia Rh D3 Wässrige Verdünnung in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt

Dosierung und Art der Anwendung

Soweit nicht anders verordnet, 1 - 5 mal täglich 10 - 15 Tropfen einnehmen.

Nebenwirkungen

In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut (Echinacea) wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise

Nach Ablauf des auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums sollte das Präparat nicht mehr angewendet werden.

Nach Anbruch der Packung ist das Präparat 3 Wochen im Kühlschrank haltbar.

Stand der Information: Februar 2001

Ergänzende Information

Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen.

