

ORALMEDIC®

Stoppt den Schmerz im
Mund oft schon in Sekunden!

Gefüllte Applikatoren für eine gezielte Anwendung an der entzündeten Mundschleimhaut

Eine einzige Anwendung von **ORALMEDIC®** stoppt den Schmerz im Mund oft schon in Sekunden (bei Aphthen oder kleinen Entzündungen der Mundschleimhaut).

ORALMEDIC® bildet eine Schutzschicht über der entzündeten Stelle (z. B. einer Aphthe) und schafft so günstige Bedingungen für eine natürliche Heilung.

Gebrauchsanweisung:

- 1 Trocknen Sie die entzündete Stelle mit dem Wattestäbchen.
- 2 Halten Sie das gefüllte Applikator-Stäbchen leicht schräg mit dem farbigen Ring nach oben. Knicken Sie es am farbigen Ring vorsichtig zur Seite bis es klickt.
- 3 **ORALMEDIC®** fließt nun zur gegenüberliegenden Seite des Applikators. Drücken Sie den Applikator vorsichtig für 5 - 10 Sekunden auf die entzündete Stelle und achten Sie darauf, dass diese vollständig bedeckt wird. Direkt beim Auftragen spüren Sie ein kurzes Brennen.
- 4 Spülen Sie den Mund sorgfältig mit Wasser und spucken Sie anschließend aus.



Hinweis: Im Normalfall ist eine einzige Anwendung ausreichend. Falls der Entzündungsschmerz direkt nach Ausspülen des Mundes bestehen bleibt, ist davon auszugehen, dass die entzündete Stelle nicht vollständig bedeckt wurde. In diesem Fall sollten Sie die Anwendung mit einem neuen Applikator wiederholen (anschließend wieder spülen), um die Behandlung abzuschließen. Behandeln Sie dieselbe entzündete Stelle nicht mehr als einmal. Bitte suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn die Schmerzen bestehen bleiben.

Vermeiden Sie den Kontakt mit Kleidungsstücken, da diese verfärbt oder beschädigt werden könnten.

Warnhinweise: Nicht anzuwenden bei Schwefel-Allergie, während der Schwangerschaft oder bei Kindern unter 12 Jahren. Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen.

Für den Fall, dass Augen mit **ORALMEDIC®** in Kontakt gekommen sind, entfernen Sie gegebenenfalls sofort Kontaktlinsen, spülen Sie die Augen mindestens für 15 Minuten mit Wasser aus und suchen Sie umgehend Ihren Arzt auf. **ORALMEDIC®** ist ausschließlich für die Anwendung auf der Mundschleimhaut bestimmt. Es können lokale Hautreizungen bei der Anwendung auftreten. Sollten übermäßige Hautreizungen auftreten, spülen Sie den Mund gründlich mit viel Wasser aus. Wenn sich die entzündete Stelle innerhalb von 10 Tagen nicht gebessert hat, suchen Sie bitte Ihren Arzt oder Zahnarzt auf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Raumtemperatur lagern.

Inhaltsstoffe: HYBENX (Hydroxybenzolsulfonsäure, Hydroxymethoxybenzolsulfonsäure, Schwefelsäure, Wasser, FD&C Red 40).

CE ©EPIEN Medical, Inc 2007, St Paul, MN55110, USA.
www.epien.com

Vertrieb in Deutschland:

Paracelsia Pharma GmbH, 45725 Waltrop.

EC REP Repräsentant in Europa:
Interface International Consultancy Ltd,
York, YO42 1YQ in UK.

Stand der Information: 02/07.

